

**Prélèvements obligatoires inscrits dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2018**  
*Préconisations de la Fédération des Éleveurs de Galop*  
**Analyses à faire effectuer dans un laboratoire agréé**

POUR LA JUMENT Tests à faire à partir du 1er janvier 2018 et avant toute saillie			POUR L'ÉTALON Tests à faire à partir du 1er décembre 2017 et avant la demande de carnet de saillie
TAYLORELLA KLEBSIELLA PSEUDOMONAS (obligatoire)	Site	Clitoris (sinus et/ou fosse)	Col utérin
	VIDE OU MAIDEN	- Taylorella immunofluorescence (IF), PCR ou culture bactérienne négatif : OK - Si IF ou PCR positive => résultat négatif en culture bactérienne : OK (Si résultat positif en culture bactérienne, jument infectée => ne pas faire saillir) - Klebsiella/Pseudomonas positif => OK voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsiella conseillé	<i>Taylorella négatif : OK</i> <i>Klebsiella/Pseudomonas positif =&gt; voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsiella conseillé</i> <i>Flore associée par culture interprétation par vétérinaire</i>
	PLEINE ET SUITE	Moins de 30 jours avant poulinage Taylorella (idem supra) négatif : OK Klebsiella/Pseudomonas positif => voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsiella conseillé	<i>A faire sur chaleur (dont de poulinage)</i> <i>Taylorella négatif : OK</i> <i>Klebsiella/Pseudomonas positif =&gt; voir traitement avec vétérinaire et typage capsulaire Klebsiella conseillé</i> <i>Flore associée par culture interprétation par vétérinaire</i>
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	- 1 résultat séroneutralisation ou Elisa négatif : OK - 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle : OK - 1 résultat séroneutralisation positif stable ou déclinant par rapport à 1 résultat séroneutralisation année N-1 ou N-2, un laboratoire différent est autorisé : OK - Si Elisa positif => 2 résultats séroneutralisation positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle : OK - Si 2 résultats séroneutralisation positifs croissants : => KO (Ne pas faire saillir) <i>Test datant de moins de 60 jours</i>		- 1 résultat séroneutralisation ou Elisa négatif : OK - Ou si résultat séroneutralisation ou Elisa positif => virologie sur sperme avec résultat négatif : OK (Si virologie positive, étalon excréteur => ne pas faire saillir) - Ou étalon valablement vacciné (selon protocole AMM infra) : OK <b>En cas de rupture vaccinale :</b> - 1 résultat sérologique négatif après la rupture : OK <b>- Si résultat sérologique positif : KO =&gt; virologie sur sperme avec résultat négatif : OK</b> <b>Si impossibilité de réaliser un prélèvement de sperme pour examen virologique =&gt; dossier soumis aux commissions sanitaires des stud-books concernés.</b> <i>Suite rupture ARTERVAC en 2018, effectuer une surveillance AVE des étalons pendant la saison :</i> <i>- 1 séroneutralisation avant rupture</i> <i>- 2 séroneutralisations de contrôle pendant la monte (avril et juin) :</i> <i>si titre stable ou déclinant : OK</i> <i>si titre croissant faire virologie sur sperme</i>
ANÉMIE INFECTIEUSE DES ÉQUIDÉS			Test de Coggins ou ELISA : 1 résultat négatif datant de moins de 3 mois pour 1 <sup>ère</sup> monte, puis test renouvelé tous les 3 ans
DOURINE			1 résultat sérologique négatif (Fixation Complément) de moins de 3 mois si séjour dans les 12 derniers mois dans pays non indemne de Dourine
<b>Vaccinations obligatoires inscrites dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2017</b>			
GRIPPE	Avant la saillie		Avant la demande de carnet de monte
	Vaccination préalable à la DPS Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok		Vaccination préalable à la demande de carnet Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines 1er rappel à 6 mois, puis un rappel au moins annuel : ok
RHINOPNEUMONIE	Avant la saillie		Avant la demande de carnet de monte
	Vaccination préalable à la DPS Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok		Vaccination préalable à la demande de carnet Selon AMM du vaccin, une primo vaccination : 2 injections séparées de 3 à 6 semaines, 1er rappel à 6 mois, puis rappel au moins annuel (mieux tous les six mois) : ok
<b>Toute rupture dans un protocole de vaccinations nécessite une nouvelle primo-vaccination</b>			
<b>Vaccination fortement recommandée inscrite dans l'annexe sanitaire du Stud Book Français - 2017</b>			
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE			<b>Vaccination Étalon et Boute-en-train</b> EQUIP ARTERVAC® Sérologie négative étalon maintenu en isolement primo-vaccination par 2 injections entre 3 et 6 semaines dans les 30 jours après sérologie rappel tous les 6 mois (tolérance + 2 mois) <b>tolérance portée exceptionnellement à 12 mois en 2018 pour les étalons régulièrement vaccinés depuis au moins 2 ans</b>
			Pour reprendre la vaccination après une rupture du protocole : Si sérologie négative voir supra Si sérologie positive : faire virologie sur sperme Si virologie négative : reprise vaccination Refaire primo-vaccination si rupture > 1 an
<b>TECHNIQUES D'ANALYSE</b>			
TAYLORELLA	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice Pour Newmarket analyses à réaliser par laboratoire agréé HBLB (en France, LABÉO Frank Duncombe) IMMUNOFLUORESCENCE (IF) OK UNIQUEMENT en France		CULTURE OU PCR OU IF : OK
KLEBSIELLA PSEUDOMONAS	CULTURE OU PCR OK pour 6 pays signataires Common Code of Practice		CULTURE OU PCR : OK
ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE	SERONEUTRALISATION OU ELISA si séropositive faire 2 séroneutralisations		SERONEUTRALISATION OU ELISA si vacciné faire séroneutralisation
ANÉMIE INFECTIEUSE			COGGINS OU ELISA (non agréé en France) accepté pour les étalons en provenance d'autre Etat Membre test réalisé dans autre Etat Membre moins de 3 mois avant 1ère monte renouvelé tous les 3 ans